

Program Pemberian Obat Pencegahan Kecacingan pada anak sekolah dasar dan anak balita:

- Pemberian obat cacing dari pemerintah minimal 1 kali tiap tahun, masyarakat tidak perlu bayar obatnya.
- Anak sekolah dasar minum obat yang dibagikan pada kegiatan penjangkaran kesehatan anak sekolah
- Anak balita minum obat yang dibagikan bersamaan dengan pemberian vitamin A



Obat cacing apa yang diberikan?

- **Albendazole**, dosis tunggal (400 mg)
- Sebelum minum obat cacing, anak/balita harus sarapan dahulu di rumah masing masing.




Kapan dikatakan cacingan?

- Bila ditemukan cacing atau telur cacing dalam tinjanya
- Bila terdapat cacing yang hidup dan berkembang biak dalam usus halus manusia

Cacing apa saja yang bisa menyerang anak?

- Cacing gelang (*Ascaris lumbricoides*)
- Cacing cambuk (*Trichiuris trichiura*)
- Cacing tambang (*Necator americanus* & *Ancylostoma duodenale*)



Program Pemberian Obat Cacing untuk Anak Sekolah dan Balita



Pemberian obat minimal **1 x sekali dalam setahun**, dapat mencegah anak dari cacingan



SEMUA ANAK HARUS MENDAPAT OBAT

Tanggal Pemberian Obat: _____

Tempat: _____


**Obatnya
TIDAK
BAYAR**

Mengapa anak harus mendapat obat cacing sekali setahun?


- Anak-anak sangat mudah terinfeksi cacing perut
- Infeksi cacing memberikan dampak buruk pada anak

Apa bahaya cacingan pada anak?

- Anak mudah lelah dan rewel
- Anak menjadi kurang gizi karena cacing mengisap makanan dari usus
- Anak menjadi anemia karena cacing mengisap darah dalam tubuh
- Menurunkan kemampuan belajar pada anak sekolah
- Mengganggu pertumbuhan anak



Bagaimana anak Tertular cacing?



Makanan yang tidak higienis



BAB sembarangan



Kontak dengan tanah yang terdapat telur cacing

Apa tanda dan gejala cacingan?

- Kurang nafsu makan, lesu, perut buncit
- Berat badan menurun
- Nyeri perut, mual-mual, muntah
- Bisa diare atau sembelit
- Keluar cacing dari mulut atau dubur
- Kadang disertai gatal di sekitar anus



Bagaimana mencegah cacingan?



Cuci tangan dengan sabun, setelah BAB, setelah mencebok anak, sebelum menyiapkan makanan, sebelum makan




Minum air bersih dan air yang sudah direbus



Buang air besar di jamban



Menjaga kebersihan makanan dari lalat dengan menutupnya memakai tudung saji



Memakai alas kaki

Hindari anak dari sumber penularan cacingan dengan menerapkan PHBS